

Aide au choix de variétés de pommes et poires

RGF-Gblx & Trad-RGF

Version 21 mars 2021

1. POMMIER

- **Pour petits jardins et arbres très faciles à cultiver:**

'Reinette Hernaut', 'Grenadier', 'Transparente de Lesdain', 'Joseph Musch', 'Alkmene', 'Reinette Dubois', 'Winston',...

- **Fruits à croquer, à manger sous l'arbre et durant quelques semaines:**

'La Paix', 'Radoux', 'Reinette Evagil', 'Transparente de Lesdain', 'Alkmene', 'Reinette Etoilée', 'Reine des Reinettes', 'Cwastresse Double',...

- **J'aime la 'Cox's Orange'** : fruits sucrés et aromatiques:

'La Paix', 'Alkmene', 'Reinette de Blenheim', 'Winston', 'Suntan', 'Reinette Evagil', 'Cwastresse Double', 'Reine des Reinettes', 'Calville des Prairies'.

- **J'aime les 'Reinettes'** : fruits acidulés et sucrés qui se 'fripent' en conservation:

'Reinette de Waleffe', 'Gris Braibant', 'Court-Pendu Rosat', 'Reinette de France', 'Reinette de Chênée', 'Suntan', 'Reinette Dubois', 'Reinette Etoilée', 'Reinette du Canada', 'Reinette Descardre'.

- **J'aime la 'Granny Smith'** : fruits croquants, juteux, acidulés :

'Reinette Hernaut', 'Président Van Dievoet', 'Godivert'

- **J'adore cuisiner les fruits** : compotes, tartes, cakes,...

'Transparente Blanche', 'Geneva', 'Reinette de Blenheim', 'Reinette Hernaut', 'Président Van Dievoet', 'Godivert', 'Grenadier', 'Président Roulin', 'Jacques Lebel', 'Reinette Etoilée', 'Reinette de France', 'Reinette de Waleffe', 'Joseph Mush', ...

- **J'aime faire du jus et/ou du cidre :**

'Reinette Hernaut', 'Reinette de Waleffe', 'Gris Braibant', 'Président Van Dievoet', 'Gueule de Mouton', 'Calville des Prairies', 'Joseph Mush', 'Cwastresse Double', 'Joseph Musch'...

- **Variétés de très longue conservation naturelle** : fruits d'hiver en bonnes conditions de conservation chez un amateur (bonne cave, abris de jardin, remise,...) :

'Gueule de Mouton', 'Président Van Dievoet', 'Reinette Dubois', 'Reinette de Waleffe', 'Godivert', 'Gris Braibant', 'Reinette Hernaut', 'Winston',...

Tableau 3 – Classement de variétés de pommes suivant la tendance des fruits à devenir « farineux » (chair plus tendre, sèche, sans structure et devenant « pâteuse en bouche ») au cours de l'évolution des fruits après cueillette en conditions de conservation d'amateurs (bonnes caves, abris de jardins, remises,...)

<u>Variétés "RGF-Gblx"</u>			<u>Variétés "Trad-RGF"</u>		
	La Paix				Reinette Hernaut
Geneva				Gris Braibant	
	Joseph Musch	Transparente de Lesdain			Président Van Dievoet
Grenadier	Reinette de Blenheim				Godivert
Président Roulin		Radoux			Reinette Dubois
	Cwastrêsse Double				Reinette de Waleffe
Forte tendance à devenir farineux			Moyenne tendance à devenir farineux		
Faible tendance à devenir farineux ("se frippe")					
					Gueule de Mouton
			Reinette de France		Court-Pendu Rose
Jacques Lebel		Reinette Etoilée			Jonathan
	Reine des Reinettes				
		Reinette du Canada Blanc			Winston
	Reinette Descardre				
Transparente Blanche				Calville des Prairies	
	Alkmene	Reinette de Chênée			
		Belle-Fleur Large Mouche			
	Belle-Fleur de France			Belle-Fleur de Brabant	



Tableau 4 – Classement relatif de variétés de pommes suivant leurs périodes optimales de cueillette pour une bonne conservation en conditions de conservation d'amateurs (bonnes caves, abris de jardins, remises,...)

GROUPES de PERIODES RELATIVES de CUEILLETTE				
<u>Variétés "RGF-Gblx"</u>				
		La Paix		
Geneva		Joseph Musch		Gris Braibant
		Radoux		Reinette Hernaut
Grenadier	Transparente de Lesdain	Reinette de Blenheim	Godivert	Président Van Dievoet
		Cwastrêsse Double		
		Président Roulin	Reinette de Waleffe	
				Reinette Dubois
Très précoce	Précoce	Moyenne	Tardive	Très Tardive
<u>Variétés "Trad -RGF"</u>				
				Gueule de Mouton
		Court-Pendu Rose		
		Reinette de France		
		Calville des Prairies		Jonathan
	Reine des Reinettes			
		Reinette Descardre		Winston
		Reinette de Chênée		
Transparente Blanche		Reinette du Canada Blanc		
	Alkmene			
		Reinette Etoilée		
		Jacques Lebel		
			Belle-Fleur de Brabant	
			Belle-Fleur Large Mouche	
			Belle-Fleur de France	



Tableau 5 – Classement relatif de variétés de pommes suivant leurs tendances à laisser chuter leurs fruits par périodes venteuses à l’approche de la maturité des fruits sur les arbres. Information importante pour pouvoir planifier les périodes relatives et l’ordre de priorité de cueillettes optimales suivant les variétés.

<u>Variétés "RGF-Gblx"</u>			<u>Variétés "Trad-RGF"</u>		
		Reinette Hernaut			
		La Paix			
	Geneva	Reinette de Waleffe			Président Van Dievoet
Joseph Musch		Transparente de Lesdain			
Grenadier	Reinette de Blenheim	Godivert			
	Président Roulin	Radoux			Reinette Dubois
	Cwastrèsse Double				
Forte tendance à chuter en période de maturité			Moyenne tendance à chuter en période de maturité		
		Court-Pendu Rose			Gueule de Mouton
Reinette Etoilée		Reinette de France			
Jacques Lebel		Calville des Prairies			Jonathan
	Reine des Reinettes				
	Reinette du Canada Blanc				Winston
	Reinette Descardre				
Transparente Blanche		Reinette de Chénée			
		Alkmene			
	Belle-Fleur Large Mouche				
	Belle-Fleur de France	Belle-Fleur de Brabant			



Tableau 6 – Classement relatif de variétés de pommes suivant l’optimisation de réaliser la cueillette en un, deux ou trois passages en tenant compte à la fois du risque variétal de chute des fruits, de la qualité gustative et surtout, de l’amélioration des capacités de conservation en cours d’hiver en conditions d’amateurs.

<u>Variétés "RGF-Gblx"</u>			<u>Variétés "Trad-RGF"</u>		
		Reinette Hernaut			
		La Paix			
	Geneva	Reinette de Waleffe			
Joseph Musch		Transparente de Lesdain			
	Reinette de Blenheim	Reinette Dubois			
	Président Roulin	Grenadier			
		Cwastrèsse Double			
		Radoux			
		Godivert			
Cueillette en 1 passage			Cueillettes en 2 à 3 passages		
		Court-Pendu Rose			Gueule de Mouton
		Calville des Prairies			Reinette de France
	Reine des Reinettes				Winston
	Reinette du Canada Blanc				
	Reinette Descardre				
	Reinette de Chénée				
					Alkmene
	Belle-Fleur Large Mouche				
	Belle-Fleur de France				
	Belle-Fleur de Brabant				
					Reinette Etoilée
	Jacques Lebel				Transparente Blanche
					Jonathan



2. POIRIER:

- **Pour petits jardins et arbres très faciles à cultiver:**

'Ananas de Courtrai', 'Beurré Lebrun', 'Calebasse à la Reine', 'Beurré Dilly', 'Conference', 'Triomphe de Vienne', 'Madame Grégoire', 'Nec Plus Meuris', 'Beurré Superfin'.

- **J'aime la 'Doyenné du Comice'** : fruits devenant fondants, juteux, beurrés, sucrés/acidulés :

'Bon Chrétien Williams', 'Précoce de Trévoux', 'Beurré Superfin', 'Louise Bonne d'Avranches', 'Beurré de Naghin', 'Madame Grégoire', 'Nec Plus Meuris', 'Beurré d'Hardenpont', 'Joséphine de Malines', 'Jules d'Airoles', 'Jeanne d'Arc',...

- **J'aime les poires très sucrées et très peu acidulées:**

'Ananas de Courtrai', 'Seigneur Esperen', 'Triomphe de Vienne', 'Conference', 'Beurré Lebrun', 'Légipont', 'Comtesse de Paris'...

- **J'aime les poires acidulées/sucrées :**

'Précoce de Trévoux', 'Double Philippe', 'Beurré Alexandre Lucas', 'Bronzée d'Enghien'

- **Pour les enfants, fruits à croquer sous l'arbre:**

'Précoce Henin', 'Ananas de Courtrai', 'Double Philippe', 'Calebasse à la Reine', 'Beurré Dilly', 'Beurré Superfin'.

- **J'aime les poires aux arômes « musqués » :**

'Poire à Clément', 'Bon Chrétien Williams', 'Beurré Lebrun', ('Madame Grégoire')..

- **J'aime les poires à cuire et à transformer:**

'Bon Chrétien Williams', 'Double Philippe', 'Calebasse à la Reine', 'Saint-Mathieu', 'Poire de Gros', 'Bronzée d'Enghien', 'Saint-Rémy', 'Poire de Livre', 'Catillac'.

Tableau 7 – Classement de variétés de poires suivant leurs périodes optimales de consommation et évolution en conditions de conservation d’amateurs (bonnes caves, abris de jardins, remises,...)




Tableau 8 – Tableau récapitulatif des principales caractéristiques agronomiques, de sensibilité aux principales maladies, de période de cueillette et maturité et des principales qualités gustatives et usages de variétés de poires en conditions de conservation d'amateurs (bonnes caves, abris de jardins, remises,...)

Variétés (par ordre de maturité)	Expositions conseillées pour espaliers	Adaptation		Période relatives de cueillette & consommation	Groupe relatifs de floraison	Qualité du pollen	Auto- fertilité	Sensibilité		Qualité		Balance sucre (s)/acide (a)
		Demande entre- greffe sur cognassier	Haute Tige					Tavelure	Table	Cuisso n		
Précoce de Trévoux ^{Trad-RGF} (F, 1862)	N, E, S	± OUI	-	m08	2	+	(AF)	MS	++		S=A	
Précoce Henin ^{RGF-Gblx} (B, ~1970)	N, E, S, O	NON	±	m08	3	+		PS	+ / ++		S=A	
Bon Chrétien Williams ^{Trad-RGF} (UK, 1770)	N, E, S	OUI	-	f08-09	4	+		MS	+ / ++	+	S=A + M	
Ananas de Courtra ^{Trad-RGF} (B, 1784)	N, E, S, O	NON	-	f08-09	3	+		PS	± / +		s	
Calebasse à la Reine ^{Trad-RGF} (B, 1770)	E, S, O	NON	+	f08-09	4 à 5	+		PS	+	++	S=A + (ast)	
Triomphe de Vienne ^{Trad-RGF} (F, 1874)	E, S, O	OUI	±	d09	4 à 5	+		PS	+		S	
Beurré Dilly ^{RGF-Gblx} (B, 1840)	N, E, S, O	NON	+	d09-d10	3 à 4	+		PS	+	+	S>a	
Poire de Gros ^{RGF-Gblx} (B, var. paysanne)	N, E, S, O	OUI	++	d-m09-10	3 à 4	-		PS	±	++	S=A	
Seigneur Esperen' (B, 1827)	E, S, O	NON	-	m09-10	4	+		MS ⁽¹⁾	+ / ++		S	
Beurré Superfin ^{Trad-RGF} (F, 1844)	E & S	NON	-	m09-10	4 à 5	+	(AF)	MS	++		S=A	
Double Philippe ^{Trad-RGF} , 'Doy. Boussoch', 'B ^{rré} de Mérode' (B, 1800)	N, E, S	OUI	++	m09-10	3	-	(AF)	MS	+	+	S=A	
Beurré Lebrun ^{Trad-RGF} (F, 1856)	N, E, S, O	NON	±	m09-10	3 à 4	+	AF	PS	+	+	s + m	
Conférence ^{Trad-RGF} (UK, 1884)	E & S	NON	±	m09-11	4 à 5	+	AF	MS ⁽¹⁾	+	±	S	
Saint-Mathieu ^{RGF-Gblx} (B? ou F?)	N, E, S, O	OUI	++	m09-11	5	-		PS ⁽¹⁾	±	++	S>a + (ast)	
Louise Bonne d'Avranches ^{Trad-RGF} (F, 1778)	E & S	NON	-	f09-10	2 à 3	+	(AF)	MS/TS	++		S=A	
Beurré Chaboceau ^{Trad-RGF} , 'Jefkespeer' (B, 1790)	E, S, O (Haute tige)	(Haute tige)	++	f09-10	4 à 5	+		PS	+	++	S>a	
Beurré Hardy' (F, 1820)	E & S	NON	-	f09-10	4	+		TS	+ / ++		S=A	
Durondeau' (B, 1811)	E & S	NON	-	f09-11	4	+	(AF)	TS	+	+	s<A + (ast)	
William's Duchess' (UK, 1841)	E & S	NON	-	f09-10	4	-		MS	± / +	+	S=A + (ast)	
Légipont ^{Trad-RGF} (B, ~1800)	E & S	OUI	++	f09-11	3 à 4	+		MS/TS	++		S	
Doyenne du Comice' (F, 1849)	E & S	NON	-	d10-11	6 à 7	+		TS	+++		S=A	
Duchesse d'Angoulême' (F, 1840)	E & S	NON	-	d10-11	3 à 4	+		TS	+ / ++		S=A	
Nec Plus Meuris ^{RGF-Gblx} ('Beurré d'Anjou') (B, 1822)	E, S, O	OUI	±	d10-12	2	+		PS	+ / ++		S=A	
Jeanne d'Arc' (F, 1893)	E & S	NON	-	d10-12	4 à 5	+		MS/TS	+		S=A	
Jules d'Airoles ^{Trad-RGF} (F ou B, 1836)	E & S	NON	?	m10-12	6	± à -?		MS	+ / ++	+	S=A	
Beurré de Naghin' (B, 1840)	E & S	NON	+	m10-12	3 à 4	+		MS	+ / ++		S=A	
Beurré d'Hardenpont ^{Trad-RGF} (B, 1759)	E & S	NON	±	m10-01	4 à 5	±		MS/TS	+ / ++		S=A	
Beurré Alexandre Lucas ^{Trad-RGF} (F, 1870)	E & S	± OUI	+	m10-01	1 à 2	-		MS ⁽¹⁾	+	+	s<A	
Madame Grégoire ^{RGF-Gblx} (B, 1860)	E & S	± OUI	+	m10-02	1 à 2	-		PS/MS ⁽¹⁾	+	+	s=a	
Joséphine de Malines ^{Trad-RGF} (B, 1830)	E, S, O	± OUI	±	f10-01	5	+		PS	+ / ++		S	
Bronzée d'Enghien ^{RGF-Gblx} (B, 1830)	E, S, O	NON	++	d-m10-02	4 à 5	+		PS	+	++	s<A + (ast)	
Comtesse de Paris ^{Trad-RGF} (F, 1884)	E, S, O	NON	+	m10-02	1	+		PS	+ / ±	+	s	
Saint-Rémy' (B, ± 1850)	E & S	OUI	++	m10-04	4	-		MS/TS	-	++	ast	

(1) : Variétés dont la sensibilité à la tavelure varie fortement d'un endroit à l'autre en fonction des races de tavelure et de la pression d'infection

RGF-Gblx : Ressources Génétiques Fruitières - GEMBLoux ; Trad-RGF = Variétés traditionnelles